

## Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji

Część nr.	Opis szczepionek	Odbiorca docelowy (apteka szpitalna placówki)	Ilość dawek do zakupu	Razem ilość dawek do zakupu
1	Szczepionka w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce wskazana do czynnego uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A) u młodzieży od ukończenia 16 roku życia i u dorosłych. Jedna dawka (0,5) ml zawiera wirus zapalenia wątroby typu A, szczep GBM (inaktywowany) 160 jednostek antygenowych ELISA	Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	20	20
2	Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, absorbowana na wodorotlenku glinu do czynnego uodpornienia przeciwko IChM wywołanej przez meningokoki grupy B, zawiera 3 rekombinowane białka: NHBA, NaDA i fHbp po 50 mikrogramów oraz pecherzyki błony zewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ 98/254 białko zawierające PorA P1.4. - 25 mikrogramów. Preparat ten można stosować u dzieci po ukończeniu 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych. Zawiesina do wstrzyknięć w ampulko-strzykawce 0,5 ml.	Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	30	98
		Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	5	
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego ul. Kniaziewiczza 1/5, 91 – 347 Łódź	3	
		Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa	60	
3	Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny do wstrzykiwań zawierająca 20µg oczyszczone antygeny powierzchniowego wirusa HBs w 0,5 ml absorbowanego na wodorotlenku glinu, uzyskiwanego z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae). Szczepionka stosowana jest w celu uzyskania czynnej odporności przeciwko zakażeniu wszystkimi znanymi podtypami HBV, dla pacjentów powyżej 16 roku życia narażonych na zakażenie HBV lub wymagających doszczepiania.	Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa	20	20
4	Szczepionka stosowana w celu zapobiegania chorobie wywołanej przez wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Postać: zawiesina do wstrzykiwań; 1,2 µg/0,25 ml (1 dawka (0,25 ml) zawiera 1,2 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudörfl) adsorbowanego na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,17 mg Al)); 1 ampulkostrzykawka 0,25 ml. Jest przeznaczona do szczepienia dzieci w wieku powyżej 1 roku do 15 lat.	Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	35	60
		Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	25	
5	Szczepionka stosowana w celu zapobiegania chorobie wywołanej przez wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Postać: zawiesina do wstrzykiwań; 2,4 µg/0,5 ml (1 dawka (0,5 ml) zawiera 2,4 µg całego, inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudörfl) adsorbowanego na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,35 mg Al)); 1 ampulkostrzykawka 0,5 ml. Jest przeznaczona do szczepienia dzieci w wieku powyżej 16 lat.	Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	35	35
6	Szczepionka stosowana u mężczyzn i kobiet w wieku dziewięciu lat i starszych w celu ochrony przed chorobami spowodowanymi przez HPV. Zawiera wysoko oczyszczone, niezakaźne białka dla każdego z typów wirusa brodawczaka ludzkiego (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) w ampulkostrzykawkach z tłokiem po 0,5 ml. Poza wirusami HPV zawiera białko L1 w postaci wirusopodobnych cząsteczek wytwarzanych w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Szczep 1895)) technologią rekombinacji DNA adsorbowane na adiuwancie, amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,5 miligrama Al).	Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	30	82
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego ul. Kniaziewiczza 1/5, 91 – 347 Łódź	7	
		Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	15	
		Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	30	
7	Szczepionka dla osób od 16. roku życia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) - zawiesina do wstrzykiwań zawierająca inaktywowane wirusy zapalenia wątroby typu A. Jedna dawka (1 ml) zawiera wirusy zapalenia wątroby typu A, szczep HM175 (inaktywowany) 1,2 nie mniej niż 1440 jednostek ELISA.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego ul. Kniaziewiczza 1/5, 91 – 347 Łódź	8	8
8	Szczepionka dla dzieci przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) zawiesina zawierająca inaktywowane wirusy zapalenia wątroby typu A. Każda dawka szczepionki jest standaryzowana na zawartość antygenu wirusowego , która nie może być mniejsza niż 720 jednostek ELISA w 0,5 ml zawiesiny.Wskazania:Szczepionkę stosuje się w celu uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) dla dzieci od ukończenia 1-go roku życia narażonych na zakażenie wirusem HAV.	Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa	40	102
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego ul. Kniaziewiczza 1/5, 91 – 347 Łódź	8	
		Apteka Szpitalna Szpital Św. Wojciecha ul. Jana Pawła II 50, 080-462 Gdańsk	4	
		Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	20	
		Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	30	
9	Szczepionka zawierająca toksoid błonicy , toksoid tężcowy , trzy oczyszczone antygeny krztuśca , trzy typy inaktywowanego wirusa polio oraz oczyszczone składniki Haemophilus influenzae typu B (Hib) i oczyszczony białkowy antygen HBs Wskazania:SzczepionB4:B12ka opisana powyżej jest wskazana do aktywnego uodpornienia dzieci od 2 miesiąca życia przeciwko błonicy , tężcowi , krztuścowi, Poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu B (Hib) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – w schemacie szczepienia pierwotnego ( 3 dawki) uzupełniającego (1 dawka)	Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	40	75
		Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	15	
		Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	20	
10	Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom z grup: A, C, W-135 oraz Y (każdy składnik po 5 mikrogramów ), skoniugowane z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym - 44 mikrogramy. Opakowanie dla jednego dziecka zawiera: 1 fiolka: proszek plus 1 ampulkostrzykawka z rozpuszczalnikiem = 1 dawka (0,5 ml). Czynne uodparnianie osób w wieku powyżej 12 miesięcy	Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa	50	97
		Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	20	
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego ul. Kniaziewiczza 1/5, 91 – 347 Łódź	2	
		Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	25	
11	Poliwalentna szczepionka pneumokokowa, 20 walentna, adsorbowana szczepionka polisacharydowa, koniugowana, przeciwko pneumokokom, obejmująca serotypy polisacharydowe Streptococcus pneumoniae 1,3,4,5,6A,6B,7F,8,9V, 10A,11A,12F,14,15B,18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F,każdy skoniugowany z białkiem nośnikowym. Wskazania: Uodpornienie czynne w zapobieganiu chorobie wywołanej przez Streptococcus pneumoniae. Zawiesina do wstrzyknięć ampulko-skrzykawka zawierająca 1 dawkę (0,5 ml). Przeznaczonego do stosowania u dzieci od 6-ego tygodnia życia do 18-tego roku życia.	Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa	20	70
		Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie Osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków	30	
		Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	20	
12	Liofilizowana szczepionka zawierająca żywe atenuowane wirusy Varicella zoster (szczep Oka) w ilości nie mniej niż 2000 PFU. Wskazania : dla osób zdrowych do czynnego uodparniania przeciw ospie wietrznej (od 9 mies. życia),fiolka z liofilizatem + ampulkostrzykawka z rozpuszczalnikiem	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Pasteura7a, 50 – 367 Wrocław	30	52
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego ul. Kniaziewiczza 1/5, 91 – 347 Łódź	2	
		Szpital Specjalistyczny in. S. Żeromskiego w Krakowie osiedle Na Skarpie 67, 31-913 Kraków	20	

Termin realizacji: 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Data ważności: min. 16 m-cy od daty dostawy do odbiorcy docelowego