

| GOSPODAROWANIE ZIELEŃNI ISTNIEJĄCA | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|------|---------------|--|--|
| L.P. | NAZWA POLSKA | NAZWA ŁACIŃSKA | OBWÓD PNIA /130CM (CM) | OBWÓD PNIA /5CM (CM) | ŚREDNICA KORONY (M) | WYS. | STAN ZROWOTNY | OPIS | PRZEZNACZENIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wiśnia osobliwa odm. 'Umbraculifera' | <i>Prunus x eminens</i> 'Umbraculifera' | 55 | powyżej 50cm | 3 | 3 | dobry | zbliżenie osłony pnia do samego pnia; do obserwacji i ew. wymiany na większą | adaptacja |
| 2. | Wiśnia osobliwa odm. 'Umbraculifera' | <i>Prunus x eminens</i> 'Umbraculifera' | 55 | powyżej 50cm | 3 | 3 | dobry | widoczne pęknięcie mrozowe; zbliżenie osłony pnia do samego pnia; do obserwacji i ew. wymiany na większą | adaptacja |
| 3. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 60 | 79 | 4,5 | 4 | dobry | korona nieco asymetryczna z uwagi na wyłamanie jednego z konarów | przesadzenie w miejsce wskazane przez UM |
| 4. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 65 | 80 | 5 | 4 | dobry | widoczne wypróchnienie w jednym z konarów | przesadzenie w miejsce wskazane przez UM |
| 5. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 76 | 89 | 5 | 4 | dobry | lekki posusz | przesadzenie w miejsce wskazane przez UM |
| 6. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 39 | 45 | 1,5 | 3 | zły | asymetryczna, mocno zredukowana korona - prawdopodobnie przez znaczny posusz | usunięcie |
| 7. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 53 | 65 | 3 | 4 | średni / zły | asymetryczna, zredukowana korona - prawdopodobnie przez znaczny posusz; widoczne ślady po cięciach grubszych gałęzi | usunięcie |
| 8. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 34 | 39 | 1 | 3 | martwe | drzewo martwe | usunięcie |
| 9. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 49 | 52 | 1,5 | 3,5 | średni / zły | asymetryczna, mocno zredukowana korona ze śladami po cięciach grubszych gałęzi - prawdopodobnie przez znaczny posusz | usunięcie |
| 10. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 44 | 53 | 3 | 3,5 | średni / zły | ślabo rozwinięta / zredukowana korona | usunięcie |
| 11. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 43 | 48 | 3 | 3,5 | średni / zły | ślabo rozwinięta / zredukowana korona; ślady po usuwanych gałęziach | usunięcie |
| 12. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 38 | 41 | 3 | 3,5 | średni / zły | ślabo rozwinięta / zredukowana korona; ślady po usuwanych gałęziach | usunięcie |
| 13. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 55 | 56 | 3 | 4 | średni / zły | ślady po usuwanych gałęziach | usunięcie |
| 14. | Robinia akacjowa odm. 'Umbraculifera' | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | 57 | 63 | 4,5 | 5 | dobry | ślady po usuwanych gałęziach | przesadzenie w miejsce wskazane przez UM |